

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה
השירותים הווטרינריים בשדה

הנחיות לחיסון צאן נגד דבר ואבעבועות צאן

הערות	חיסון דחף	גיל חיסוני השגר		בע"ח	שם המחלה
		לאמהות לא חוסנות	לאמהות מחוסנות		
חיסון חובה. אין חובת חיסון של צאן בוגר מדי שנה; במקרי התפרצויות של המחלה ייתכנו חיסונים חוזרים בהתאם להחלטת השו"ט.	בגיל 4-6 חודשים	מגיל יום אחד	מגיל חודשיים	כבשים ועיזים	דבר צאן
חיסון חובה, הניתן לכבשים בלבד. במקרי התפרצויות של המחלה ייתכנו חיסונים חוזרים בהתאם להנחיות השו"ט.	צאן בוגר אחת לשנה	מגיל יום אחד	מגיל חודשיים	כבשים בלבד	אבעבועות צאן

הזרקה תת עורית לכבשים ולעיזים

הזרקה תת עורית לכבשים ועיזים מומלץ לבצע באזור הצוואר התחתון ולא ברגל האחורית. האזור המועדף הוא במשולש שתחום ע"י עמוד השדרה ונטרלית, ה- nuchal ligament דורזלית ומאחור ע"י הכתף.

אין להזריק מעל כלוב הצלעות, שכן ניתן בקלות בטכניקה לא נכונה לחורר את בית החזה. יש לבצע את ההזרקה בעזרת מחט סטרילית באורך שלא יעלה על 1.5 ס"מ ולוודא שהמחט נמצאת מתחת לעור ולא חדרה לשריר.

משרד החקלאות ופיתוח הכפר השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה השירותים הווטרינריים בשדה

אמצעי ריסון:

על מנת לחסן כבשים ועיזים טליות וגדיות יש להשתמש באמצעי ריסון מתאימים בכדי למנוע פגיעה בבע"ח ובמחסנים.

אמצעי הריסון בדיר:

- עולים.
- תעלה.
- גדרה: תיחום הכבשים/ עיזים באמצעים מכניים, כמה גדרות מוטות וכו'.

מטרת הריסון היא לאפשר גישה לכל פרט, ללא גרימת נזקים לבע"ח כמו: חבלות, מעיכה ושברים.

יש לזכור שכל תפיסה של כבשה / עז או הכנסתה למתחם שגורם לה להצטופף עם חברותיה מהווה גורם עקה עבורה.
העקה, ככל שתהיה קשה יותר (צפיפות רבה, עולים לא מתאימים), עלולה לגרום לפגיעה בפרמטרים כמו רבייה, חוסר התעברות, המלטה מוקדמת, הפלות ועוד וכן להתפרצות מחלות מדבקות כגון פרצית ואחרות.