

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה
השירותים הווטרינריים בשדה

תאריך: כ"ח באלול, תשע"ד
10 בספטמבר 2015
חוזר: משב/2015/09

אל: מנהלי הלשכות הווטרינריות

הנדון: חיסון בקר וצאן נגד מחלת הפה והטלפיים (פו"ט), 2015 – 2016

בקר

ביום 01.10.15 יש להתחיל בחיסון השנתי של הבקר לעונת 2015 - 2016.

כל הבקר יחוסן בתרכיב **פה וטלפיים (פו"ט)** כדלקמן:

תרכיב פו"ט תלת-ערכי באמולסיה שומנית
אצוות בשימוש: **O 497 + O 439 + O 424**

ההרכב האנטיגני של התרכיב:

טיפוס **O** מכיל את האנטיגנים: O Manisa + O-3039 + O-4625 + Israel 2007 .

טיפוס **A** מכיל את האנטיגנים: A- 4165 + A Iran 05 .

טיפוס **ASIA 1** מכיל את האנטיגן: Asia 1 Shamir .

לקראת ההזרקה יובא התרכיב לטמפרטורה של $15^{\circ}\text{C} - 25^{\circ}\text{C}$. התרכיב יוזרק תוך-שרירית בצוואר בלבד; אין להזריק בחלקי גוף אחרים. לתשומת לבכם: **אין** לערבב את תרכיבי הפו"ט עם תרכיבים אחרים ואין להשתמש בתרכיבים שפג תוקפם. ניתן לשלב את מועד החיסון עם חיסון אחר.

1. בקר לחלב:

יש לחסן את כל הבקר לחלב מגיל חודשיים (2 ח') כנגד פו"ט ולסיים את החיסון עד סוף חודש דצמבר 2015.

- 1) עגלים/ות ברפתות החלב יחוסנו לפחות פעמיים, לכל המאוחר עד לגיל של 6 חודשים. החיסון השני יינתן לא יאוחר מ- 3 חודשים לאחר קבלת החיסון הראשון.
- 2) כל חיסון אחר ו/או חיסון נוסף יבוצע עפ"י בקשת המגדל על ידי הרופא המטפל בלבד.

2. בקר לבשר במרעה:

יש לחסן את כל הבקר לבשר מגיל חודשיים (2 ח') ומעלה כנגד פו"ט. אמהות ועגלות תחלוף תחוסנה עד סוף חודש ינואר 2015. חיסון הוולדות יבוצע מוקדם ככל האפשר – מגיל חודשיים ולכל המאוחר עד הגמילה.

- 1) כל קבוצת גמולים לאחר החיסון הראשון תקבל חיסון דחף אחד נוסף כנגד פו"ט.
- 2) עגלות תחלוף תהיינה מחוסנות לפחות פעמיים עד לגיל של 10 חודשים.
- 3) בעת **שגרה** אין להוציא עגלים מעדרי הבקר לבשר למשקים אחרים אלא לאחר שחוסנו לפחות פעם אחת כנגד פו"ט; בעת **התפרצות מחלה** לאחר שחוסנו לפחות פעמיים (2x) ! בשני המקרים יוצאו העגלים מהעדר לאחר 10 ימים לפחות ממועד החיסון!
- 4) כל חיסון אחר ו/או חיסון נוסף יבוצע עפ"י בקשת המגדל על ידי הרופא המטפל בלבד.

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה
השירותים הווטרינריים בשדה

3. חיסון בקר בתחנות ובמקומות הסגר

- 1) ראשי הבקר המיובאים לישראל יחוסנו כנגד פו"ט 48 שעות לאחר קליטתם בתחנות ההסגר הממשלתיות ובמקומות ההסגר המאושרים (רמלה, חיפה, דור, צופר ואילות) וכן במקומות נוספים אם וכאשר יאושר.
- 2) חיסוני הפו"ט יבוצעו בשלב הנוכחי על ידי הלשכות הווטרינריות.
- 3) כל חיסון אחר ו/או חיסון נוסף יבוצע עפ"י בקשת היבואן על ידי הרופא המטפל בלבד.

4. חיסון במפטמות של עגלים מקומיים ועגלי יבוא

כל מנהל לשכה ימנה רופא אחראי לנושא החיסונים במפטמות שמתפקידו יהיה לעקוב ולוודא ביצוע תכנית החיסון של כל המפטמות בתחום הלשכה.

לתשומת לבכם: 4 – 6 שבועות לאחר הגעת העגלים למפטמה, חובה לחסנם בחיסון דחף כנגד פו"ט. ככלל, יש להיכנס לפחות אחת לארבעה חודשים לכל מפטמה!

הנחיות החיסון בהתאם למקור העגלים:

- 1) עגלים מקומיים (ילידי הארץ) הנמכרים מרפת החלב בגילאים של עד חודשיים – יחוסנו פעמיים במפטמה הקולטת עד גיל 6 חודשים.
- 2) עגלים גמולים מעדרי הבקר לבשר – יקבלו חיסון ראשון בעדר המקור וחיסון שני עד 6 שבועות לאחר קליטתם במפטמה.
- 3) עגלי יבוא (מאירופה ומאוסטרליה) – יקבלו חיסון ראשון בתחנות ובמקומות ההסגר המאושרים כאמור וחיסון שני עד 6 שבועות לאחר קליטתם במפטמה.

צאן

כל הצאן יחוסן בתרכיב פה וטלפיים דו-ערכי באמולסיה שומנית.

O 436 + O 410 בשימוש:

ההרכב האנטיגני של התרכיב:

טיפוס O מכיל את האנטיגנים: O-4625 + O-3039 + O Manisa .

טיפוס A מכיל את האנטיגן: A-4165 + A- Iran 2005

לקראת ההזרקה יובא התרכיב לטמפרטורה של $15^{\circ}\text{C} - 25$. התרכיב יוזרק תוך-שרירית בצוואר בלבד.

לתשומת לבכם: אֵין לערבב את תרכיבי הפו"ט עם תרכיבים אחרים ואין להשתמש בתרכיבים שפג תוקפם. ניתן לשלב את מועד החיסון עם חיסון אחר.

כללי

- 1) כל ראשי הצאן (לחלב ולבשר) יחוסנו מגיל חודשיים ומעלה, כל עדר במועדו השנתי. יש להקפיד על 12 חודשים מחיסון קודם.
- 2) גיל חיסוני השגר – לאמהות מחוסנות מגיל 2 חודשים, לאמהות לא מחוסנות מגיל 1 יום.

1. חיסון צאן במקומות ותחנות הסגר

- 1) ראשי הצאן המיובאים לישראל יחוסנו כנגד פו"ט 48 שעות לאחר קליטתם בתחנות ההסגר הממשלתיות ובמקומות ההסגר המאושרים בישראל.
- 2) חיסוני הפו"ט יבוצעו בשלב הנוכחי על ידי הלשכות הווטרינריות.
- 3) חיסוני החובה האחרים (דבר צאן ואבעבועות צאן) ו/או כל חיסון אחר יבוצעו עפ"י בקשת היבואן על ידי הרופא המטפל בלבד.

**משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה
השירותים הווטרינריים בשדה**

פינות חי וגני חיות

- 1) בקר וצאן יחוסנו בהתאם למפורט לעיל.
- 2) בעלי חיים אחרים, לרבות חיות בר בשבייה, יחוסנו בהתאם ל"הנחיות לחיסון בפינות חי".

בברכת שנה טובה,



ד"ר ר. עוזרי
מנהל השירותים הווטרינריים בשדה

רשימת תפוצה :

מנהל השירותים הווטרינריים
מנהל המכון הווטרינרי
רופא וטרינר ראשי ליבוא ויצוא
רופא וטרינר למחלות צאן
רופא וטרינר ארצי למחלות חזירים
רופא וטרינר אחראי לקלוטי פרסה, גמלים ופינות חי
רופא וטרינר ראשי לפיקוח על מוצרים מן החי
רופא וטרינר אחראי על פיקוח תכשירים וטרינריים
מנהל המעבדה לאבחון ויראלי
מנהל המעבדה לפה וטלפיים
מנהלי חטיבות, המכון הווטרינרי
אתר אינטרנט שו"ט